

Doktor Blunds Ketamindosering

Standardsövning (RSI)

IV: 1,5-2mg/kg (lägre delen av intervallet för patient i chock)

Delayed Sequence Intubation (DSI)

IV: 1mg/kg under en minut (för att undvika andningsuppehåll)

Upprepade doser om 0,5 mg/kg tills patienten är dissocierad

Smärtlindring

IV: 0,1-0,3 mg/kg (infusion 0,1-0,3 mg/kg/min)

IM: 1-5 mg/kg

Premedicinering/sedering (mest till barn, men även till vuxna med svåra funktionshinder)

PO: 10 mg/kg + Midazolam 0,3-0,4mg/kg (max 10mg). Blanda med saft eller juice

PR: Samma dos som PO, kan ges via clinifeeding-sond eller liknande

IM: 4-5mg/kg (högre dos ger oftast full anestesi)

Sedering av agiterad vuxen

IM: 5-15 mg/kg

Ketofol (för sedering)

Ketamin 5mg/ml + Propofol 5mg/ml = "10 mg/ml"

Spädningsschema:

Med Propofol 10mg/ml och Ketalar 10mg/ml: Dra upp 10ml av vardera i en 20 ml spruta - ger 20 ml Ketofol "10mg/ml"

Med Propofol 10mg/ml och Ketalar 50mg/ml: Dra upp 8ml NaCl + 2mL Ketalar + 10 ml Propofol - ger 20 ml Ketofol "10mg/ml"

IV: 0,5 mg/kg bolus, upprepa med halv dos (1-3 min intervall) till önskad effekt